

## حكومة فلسطين

## دائرة الزراعة ومصائد الاساك

الاحاديث الزراعية المذاعة على المزارعين خلال شهر كانون الاول سنة ١٩٣٨ ( ما عدا الاحاديث المنشورة في الملحق الزراعي )

الصفحة

W.

زراعة الزهور في حداثق المدارس

## زراعة الزهور في حدائق المدارس

ان المزارعين الذين يصغون الى محاضرتى في هذه الليلة سيسائلون أنفسهم أو رفقاءهم الذين يصغون معهم ما علاقة حدائق الزهور في تعليم الاولاد. ولكن اذا أمعنتم النظر قليلا لتبين لكم عدم الدقة في هذه الملاحظة خصوصا اذا تسائلتم عن الواردات التى استحصل عليها أو التى يمكن الاستحصال عليها في انتاج وبيع الزهور وبدورها. فلو أحصيتم عدد المحلات التى تتعامل في بيع الزهور وبذور الزهور في البلدان الفلسطينية الكبيرة لتحققتم صدق حديثي هذا. واؤكد لكم أن زراعة الزهور هى ممتعة أكثر من الزراعة العادية أو زراعة الخضروات. كم أنها تعد من أهم أسس التعليم الابتدائي الزراعي في مدارس البنين والبتات. فالتلامذة الذين يزرعون شتول الخضروات في بساتين المدارس يمكنهم بالسهولة نفسها أن يزرعوا بذور الزهور وينتجوا الشتول منها.

ان الغاية من تشجيع الاولاد في المدارس على ذراعة الزهور ليس لنجميل بساتين مدارسهم فحسب بل لتعليمهم تطور حياة النبات ان كان هذا النبات من الحضروات أو الحبوب أو الازهار

ولاجل أن أحدثكم الآن عن زراعة الزهور حسب أصولها بقدر ما يسمح لى ونتى هذا فانى أقول آن هناك عدة نقاط أساسية من الواجب انباعها على غرار الاصول المسعة في زراعة الحضروات وهي :—

- ١) تهيئة التربة جيدا
  - ٢) تسميد الارض
    - ۴) الرى

ومن ثم الاعتناء بالتقليم والتشذيب وهما يعتبران معا من الوسائل الواقية ضد الامراض كما هو الامر في الاشجار والخضروات

ان أحوال الطقس الطبيعية والارتفاع ونوع التربة لها التأثير الكلى في نوع الزهور التي يراد زرعها كما للتأثير في وقت الزراعة أيضا. ولكي تتم الغاية التي أرمى اليها في هذا الحديث أود أن أقسم المناطق حسب التغييرات الجوية الى (١) حدائق المدارس في الجبال و (٢) حدائق المدارس في السهول. ولكن قبل هذا أربد أن أتحدث قليلا عن الزهور و أقسامها. وهي تقسم الى الائه أو أربعة أقسام. (١) الازهار السنوية أو الحولية (٢) الازهار فاسنتين (٣) الازهار الدائمة (٤) الشجيرات المزهرة. وكل من هذه تحتاج الى عناية ومعاملة محتلفتين. أما الدائمة فانها تنحصر في الانجم غالبا وتلجح أكثر من الازهار السنوية في الخطر وبما أن الازهار دات السنتين والازهار الدائمة تدوم أكثر من الازهار السنوية فمن الخطر نراعتها أو زراعة أكثرها دون أن تكون هناك مياه كافية للرى. وفوق هذا فان الاكثرية من حدائق المدارس التي شاهدتها أثناء تجوالي واقعة في مواقع مكشوفة ومن المعلوم أنه للحصول على ننائج طبية من زراعة الزهور من اللازم أن تكون محاطة بجواجز لصد الرياح العاصفة ان كان ذلك في الشتاء أو في الصف على أن لا تتعارض هذه الحواجز الواقية دون دخول الاشعة الشمسية أو الامطار. وان لا تكون أشجار الوقاية من شأنها أن تستولى على ما يخزته التراب من المواد الغذائية. ولهذا يجب أن لا تغرسوا أشجار الفلفل وأنواع على أية مواد مغذية تصادفها في التربة أو أية مواد تعطى للنبات الذي نرغب في زراعته على أية مواد مغذية تصادفها في التربة أو أية مواد تعطى للنبات الذي نرغب في زراعة على أية مواد مغذية تصادفها في التربة أو أية مواد تعطى للنبات الذي نرغب في زراعة على أية مواد مغذية تصادفها في التربة أو أية مواد تعطى للنبات الذي نرغب في زراعة

وأما من حيث تهيئة التربة وهي العامل الرئيسي الاصلى فيجب أن تكون كاملة وأن تكون التربة رخوة محفورة بعمق اما بمعرقة أو بمر اما الفأس فانه غير صالح للعمل الابتدائي

ولنفرض أن زراعتنا للزهور ستبدى، في شهر كانون الاول فأول ما يجب تمله أن تعزق الاحواض بعمق كاف في شهر تشرين الاول وأن تسمد بسهاد الاصطبلات الجيد الاختمار ليقلب مع التربة، وهذا النوع من السهاد مفيد لباقى أنواع النباتات، ومن المستطاع استعمال الفاس في عزق الاحواض أو نكشها للمرة الثانية، ولكن يجب أن يكون مسغننا كالشوكة اذا ما استعمل بعد المطرة الاولى حين تظهر الاعشاب البرية، وبعدها يمشط التراب حتى يصبح في حالة جيدة لزراعة الشتول الغضة

وقبل أن أشرح عملية انتاج الشتول أود أن أدلى اليكم بكلمة تنعلق بشجيرات الزينة أي بالشجيرات التي تجملون بها مداخل حدائق مدارسكم أما فوق الباب الخارجي

أو فوق رواق بناية مدرستكم أو فوق العرائش المشبكة التي يتفيأ الاولاد ظلها خلال أيام الصيف. وليس عندنا من النباتات ما يفوق البيكونفيلليا أو الجهنمية في هذا المضار وهكذا قل عن الياسمين الابيض أو الاصفر أو فنجال القاضي التي يسمونها في جهات أخرى نجمة الصبح. وأود أن أقترح أنه في حالة الابتداء في الشغل على التلامذة والمعلمين أن يحصروا أنفسهم في زراعة الزهور السنوية ، في الاحواض المخصصة لها بالاضافة الى ما يمكن غرسه من الورود أو الشجيرات المقلمة المفضلة على غيرها في المراكز المتوسطة من كل حوض أو أحواض الزهور. وبهذه المناسبة بمكن تعطية العرائش بورد البنكسيا الذي يمو جيدا في كلنا منطقتي الجال والسهول

والآن لنآت الى عملية انتاج الشتول. انه لمن السهل شراء البذور رخيصة بسعر ١٠ ملات للباكيت الواحد. ومهما صغر حجم الباكيت فانه يكني لتموين المزارع بما بجتاجه من شتول الازهار. أما الصناديق التي تزرع فها البذور فيكفيها طبقة سطحية من التراب في سمك ٢٠ سنتمتر وفي أسفل هذه الطبقة يمكن رصف طبقة رقيقة من الحصى مع طبئة من الفحم العادى لصرف المياه الزائدة. وإذا ما استعملت انصاف صفائح الكاز فمن الواجب خرق أسفلها لصرف الماء الزائد أيضا. أما خليط التراب فيجب أن يكون غنيا بالمواد المغذية وأن يكون مخلوطا بالرمل بدرجة تكني لان يصبح ذا مسام ومنافذ، وأن يكون بحالة يسهل فيها التنبت والانتاش. وهذا ينعلق بالجبال أكثر مما يتعلق بالبسهول التي تكون عادة غنية بالرمال

والآن كثيرا ما يتساءل الناس عن العمق الذي تزرع فيه البذور والقاعدة في مثل هذه الامور أنه كلا صغر حجم البذر كما زرع بصورة سطحية وكان غطاؤه الترابي رقيقا. لهذا ويما أن بذور الازهار أو أكثرها دقيقة جدا فان طبقة من التراب بسمك ٢-٥ مليمترا تكفي لتغطيتها، والواقع أن عددا كبيرا من أنواع الازهار من الممكن ثثر بذورها على وجه تراب الصندوق دون حاجة الى تغطيتها لان السقاية الاولى كافية لان تدفع البذور الى عمق قليل في التراب يكفي لانباتها، وعلى كل حال فالعادة أن تغطى هذه البذور حكما قاتا سابقا بسمك يتراوح بين اله والى مليمترات من التراب وان يضغط عليه اما بالبد أو بلوح من بسمك يتراوح بين اله والى مليمترات من التراب وان يضغط عليه اما بالبد أو بلوح من

الخشب. ثم يغطى الصندوق بقليل من القش أو بكيس خفيف حتى تنبت البذور. وبعدها ترفع هذه الاغطية ما دام الطقس معتذلا غير حار لتتمكن النباتات الغضة من الاستداد. ولا تنس أن تزرع البذور متفرقة غير كثيفة لان الشتول بهذا تكون أكثر صلابة وأسرع غوا. أما السقاية فواجبة دائماً. وبعد ٦ أو٧ أسابيع من زرعها يمكن نقل الشتول الى مواضعها الدائمة حسب رغبة المزارع، على أن هناك يعض الانواع تزرع رأسا في الاحواض دون حاجة الى نقلها. ولكن ارشاداتنا هذه تنعلق بالبذور التي تباع في الباكيتات

وقبل أن أعدد لكم أساء أنواع الازهار السنوية التي تزرع في الحريف لتزهر في أيام الربيع والصيف أود أن تتحقفوا أن وقت الزراعة يختلف كثيرا بين السهول وبين القدس مثلا أو الجبال بصورة عمومية. وبالرغم من هذا فان بعض الانواع التي أريد أن أسميها لكم هي صلبة العود بدرجة تجعل زراعتها ممكنة خلال مدة طويلة. انه لمن حسن طالع محبي الازهار أن يقطئوا في السهل الساحلي لانهم هناك يحصلون على ما يبتغون منها باكرا جدا. كما ان سكان الجبال عندهم أنواع تزهر حينها يكون عهد ازهارها في السهل الساحلي قد انقضى. والآن ولم يبق لي من الوقت ما يسمح لي لاعطيكم قائمة كاملة من الازهار التي تترك في الاحواض أو من الازهار التي تجني لنعرض في المزهريات فاتي الفت أنظاركم الي أنه من الممكن الحصول على هذه القائمة اذا ما طلبت من ادارة الزراعة ومصايد الاسماك

في قائمتى الكاملة ذكرت أنواع الازهار المختصة بالحوافي والتخوم والازهار التى تترك في الاحواض والازهار التى تجنى أى تقطف وتعرض في المزهريات وأعنى بالازهار التى تترك في الاحواض تلك التى تزرع في المساكب وتعطى الوانا بهيجة من الزهر اما لوحدها أو حتى مع غيرها من الازهار

أما ملكة الازهار السنوية زهرة البسيلا فانها تزرع باكرا في السهول والجبال على حد سواء ما بين شهرى آب وكانون الاول. وأما اختها ملكة الازهار ذات السنتين وهي الورد فان أفضل وقت تغرس فيه هو ابتداء موسم الشتاء. وهانان الملكتان تحتاجان الى كثير من الاسمدة. وفيها يتعلق برسم بستان الازهار وتخطيطه فانى أقول أنه بناء على صغر مساحة بستان المدرسة فلا يجب أن تعطى أهمة لهذا الامر كالاهمية التي تعطى لبستان زهور انشىء خصيصا لهذه الغاية. ومن الضرورى أن تفرز في بسنان المدرسة قطعة منفردة لانتاج الشتول. وزيادة على هذا فافى اقترح أن تحاط مساكب القرنبيط والملفوف أو أى نوع آخر من الخضروات بأنواع من الازهار تلائم الحواقي والتخوم ويمكنى أن أذكر لكم الاليسوم (حشيشة السلحفاة) وكنديتوفت (حرفة) ولوبيليا (دخان هندى) كمثل لاحسن الانواع التي لها ذلك المنظر الآخاذ. وجميع هذه الازهار من السهل ابتياعها محليا. وفيها عدا ذلك فهى تمو بنجاح منقطع النظير. كما أنه من الممكن زرعها على حوافي مساكب الازهار مع فرق طفيف ذلك أنه ممن الممكن زرعها على حوافي مساكب الازهار مع فرق طفيف ذلك الآخر. والنوع المسمى فربينا الجار تلائم زراعته كثيرا حول الحوافي في المناطق الجبلية. وكذلك القربينا الطحلية فانها تجود في المناطق ذات الاقليم الدافي، من السهول، وهناك النوع المسمى بالاقحوان قانه نمو بنجاح حول حوافي الاحواض

والآن سأعطيكم قائمة الاسماء باللغة الفنية التي يعرفها بائعو الازهار والبذور وما يقابلها بالعربية على قدر المستطاع ولهذا فاتى أرجو المستمعين الذين يوجد تحت متناول أيديهم أقلاما وأوراقا أن يدونوا عندهم الاسماء كما يسمعونها. وسأذكر لكم فيما اذا كان النوع يصلح اما أن تترك أزهاره معروضة في أحواضه أو أن نجني وتعرض في المزهريات أو لكليهما معا

وقبل أن أذكر لكم أسماء الانواع التي تزرع في فصلى الخريف والشتاء أود أن تنتبهوا الى أن كلة نبات الحواض الى أن كلة نبات الحواض تعنى النباتات التي تزرع حول الاحواض وأن كلة نبات الاحواض تعنى النباتات التي تترك مزهرة في أحواضها وان كلة نباتات المزهريات تعنى النباتات التي يقطف زهرها ويعرض في المزهريات. وهذه هي الاسماء:

حشيشة السلحفاة (Alyssum أليسوم) للحوافي تم السمكة أو حنك السبع (Antirrhinium انترينيوم) للاحواض والمزهريات حشيشة اللجاه (Aubrietia اوبريتيا) للاحواض والمزهريات قوقحان (Calandula كلانديولا) للاحواض والمزهريات خشخاش أو أبو النوم ( Poppy يوپي) للاحواض والحوافي حرفه ( Candituft كانديتوفت)

للمز هو مات للاحواض والمزهريات للمزهر بات للحوافي للاحواض والمزهريات للاحواض والمزهريات للاحواض والمزهريات للاحد اض للاحواض للاحواض للمزهريات وباقات العرائس للمز هو يات للاحواض للاحواض للحوافي للاحواض للجهات الخلفية من البستان للاحواض والحوافي للحوافي للاحواض والحوافي W colon للاحواض

قرانفل ( Carnations کار نفشار) زنىق أمازونى ( Clarkia كلاركــا) عنر ( Cornflower کررن فلاور) اقتحوان ( Daisy ديزي) قر نفل صدني ( Dianthus ديانوس) زهر اللؤلؤ ( Dimorphotheca ديورفوتكا) عنبر کشمیری ( Gaillardia جیلاردیا) حيزة افرنجة أو العتر ( Geranium جرانيوم) حششة المارك ( Genn حيوم) جودشا ( Godetia ) جودشا عرق الحلاوة ( Gypsohylla جيسوهملا) لسان العصفور ( Larkspur لاركسور) حششة الشفوق ( Linaria لناريا) کتان ( Linum لنوم) دخان هندی ( Lobelia لویللا) حة الركة ( Nigella نحللا) أبو خنجر ( Nasturtium ناستورتموم) ( Nemesia ) انمزيا حششة المر ( Nepeta نستا) زهر الثالوث ( Pansy ينسه) حششة العقرب ( Phlox فله كس) ( Petunia ) يتونا

للاحواض سالسكلوسيس ( Salpiglossis ) سالسكلوسيس للاحواض والقوارير مريمة ( Salvia سالفا) للاحواض سكىزاتتوس ( Schizanthus ) للمز هريات زهرة البسلة (Sweet Peas سويت يز) قر نفل الشعراء ( Sweet William سويت ويلمام) المحوافي والمزهريات للاحواض والحوافي رجل الحمام ( Verbena فريسا) للحو افي بنفسج ( Viola فولا ) منثور أصفر أو أزهار الحائط

( Wall Flower وول فلاور) للاحواض

أما فيها يتعلق بالازهار الصيفية فانه ليس هناك أنواع عديدة كالتي تزرع وتزهر في أيام الربيع. ولكني أذكر هنا أحسن الانواع المعروفة وهي—أسطر صبني، زينه، جناح الدبور، كاليوبسيس، وعباد الشمس الزهري، وكل هذه الانواع تستطيع أن تملاً البستان بألوار مختلفة وان تمون البيوت بالازهار التي توضع عادة في المزهريات حتى وقت الخريف ذلك الوقت الذي تظهر فيه زهرة الاقحوان النفيسة

ولم أذكر في هذا الحديث شيئًا عن الازهار البصلية التي تمو بنجاح كبير وتموتنا بأزهارها في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع ولا بد من تركها مؤقتا لاحاضركم عنها في فرصة أخرى

وانى لاهب بالتلامدة أن ينشطوا في زراعة الزهور في مدارسهم والاعتناء بها فهي عدا عما تنتجه من الواردات المادية في حالة قربهم من أسواق البلدان الكبيرة فانها لتبح لمم دراسة حياة الطبيعة بصورة عملية وتدربهم على العناية والاستقامة عند اعتبادهم على انتاج الشتول وملء بستانهم بطرائف الازهار ومباهجها والسلام علمكم